

對COVID-19疫苗相關問題的可信解答

2021年5月25日

四種COVID-19疫苗已獲准在加拿大使用，世界各地已有上億人接種了這些疫苗。本公告對有關疫苗的常見關切和問題進行了解答，以便您在接種COVID-19疫苗時能夠獲得相關的有用資訊。本公告中的資訊已經過醫生和研究人員的驗證。



患有過敏的人士可否接種疫苗？

可以，即使您對不同的食物、藥物或其他成分有嚴重的過敏反應史，接種COVID-19疫苗也是安全的。如果您有嚴重的過敏反應史，請在接種疫苗後於接種中心內等待30分鐘，以確保一切正常。在出現罕見過敏反應的情況下，現場始終會有醫務人員為您提供支援。如果您曾對COVID-19疫苗的某一特定成分嚴重過敏（例如聚乙二醇[PEG]或聚山梨酸酯）或對COVID-19疫苗的第一劑過敏，您應該與醫護人員討論如何安全地接種疫苗。請注意，這些特定的過敏現象是非常罕見的。



患有其他醫療病症的人士可否接種疫苗？

如果您有糖尿病、高血壓、心臟病、哮喘或貧血等疾病，仍可以安全地接種疫苗。如果您有特定的健康狀況或正在服用削弱免疫系統的藥物（免疫抑制性疾病或免疫抑制藥物，如化療或大劑量的類固醇藥物等）或患有自身免疫性疾病，請與醫療人員溝通，以決定何時接受疫苗最好。



是否應等待大部分人都施打疫苗？

不要等待。一旦輪到您，請立即接種疫苗。它能保護您不會因COVID-19而出現重症或死亡。截至5月25日，全世界已施打超過10億劑的COVID-19疫苗。為了結束疫情，大多數人都需要接種疫苗；越早接種疫苗，社區就越安全。



疫苗的保護效力可持續多久？

研究人員仍在試圖確定疫苗防護力的確切時長。您可能需要在未來接種加強劑，以繼續保護您免於感染COVID-19病毒。

COVID-19疫苗分一劑或兩劑注射，取決於疫苗類型。如果您接種的是兩劑型疫苗，您需要在之後注射第二劑。完整接種兩劑才能更全面地保護您不會因COVID-19出現重症或死亡。

記住：即使在接種疫苗後，您也應繼續遵守所有COVID-19的公衛防疫措施，如戴口罩、與他人保持距離、勤洗手等。

疫苗可以保護您和親友免受COVID-19侵襲。接種疫苗的人越多，公眾受到的保護也就越多！



我們希望這份公告對您有所助益！我們邀請您廣為分享，用它作為錄製音檔或影片的腳本，或將它翻譯成更多語種與他人分享。請務必注明出處：女子學院醫院（Women's College Hospital）、OCASI、TAIBU社區衛生中心和Refugee 613組織。

資料截至2021年5月25日

本公告中的資訊已經過加拿大醫生的驗證：醫學博士Meb Rashid，多倫多大學助理教授；醫學博士Vanessa Redditt，多倫多大學講師；醫學博士Isaac I. Bogoch，多倫多大學副教授



Funded by:



Immigration, Refugees and Citizenship Canada

Financé par :

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

聯合製作：

