

چرا ترکیب کردن برندهای مختلف واکسن COVID-19 مشکلی ندارد؟

بسیار حائز اهمیت است که 2 دوز واکسن COVID-19 را دریافت کنید تا به طور کامل علیه بیماری COVID-19 و گونه‌های مختلف آن واکسینه شوید. شما فقط وقتی 2 هفته از دریافت دوز 2 واکسن‌تان گذشته باشد، به طور کامل واکسینه تلقی می‌شوید.

آیا دریافت یک نوع متفاوت از واکسن COVID-19 برای دوز دوم ممکن است؟

بله! این کار برای محافظت از شما در برابر COVID-19 و گونه‌های مختلف آن بی‌خطر و موثر است.



آیا پیش از این، روش «ترکیب کردن» برای سایر واکسن‌ها انجام شده است؟

بله، این یک امر بسیار رایج است. برای مثال، برندهای مختلف واکسن هپاتیت B یا سرخک معمولاً به صورت ترکیبی به کار می‌روند.



چرا یک واکسن متفاوت برای دوز 2 به من ارائه می‌شود؟

محموله‌های وارداتی واکسن به کانادا ممکن است هر هفته متفاوت باشند و گاهی ممکن است در زمانی که باید دوز دوم خود را دریافت کنید از همان برندی که نوبت اول زده اید موجود نباشد. از آنجاییکه ما قطعاً نمی‌دانیم شما چه مدت باید صبر کنید زدن اولین واکسن در دسترس بهترین راه برای محافظت شما از کووید است.



برای دوز دوم خود باید کدام واکسن COVID-19 را دریافت کنم؟

کانادا در حال حاضر واکسن‌های Moderna و Pfizer را برای اکثر دوزهای اول و دوم ارائه می‌دهد. این واکسن‌ها اساساً مشابه و بسیار موثر هستند (حدود 95٪ موثر در جلوگیری از بیماری COVID بعد از دریافت هر دو دوز).

شما می‌توانید بدون هیچگونه خطری از دو برند مختلف واکسن COVID-19 به صورت ترکیبی برای دوز 1 و 2 خود استفاده کنید.



گزینه‌های برای دوز 2	واکسن دریافت شده برای دوز 1
Moderna یا Pfizer حداقل 21 روز پس از دوز 1	Pfizer/BioNTech
"Pfizer یا Moderna" حداقل 28 روز پس از دوز 1	Moderna
"Pfizer یا Moderna (توصیه شده) یا AstraZeneca حداقل 56 روز (8 هفته) پس از دوز 1	AstraZeneca

اگر هر یک از ترکیب‌های توصیه شده را دریافت کنید، 2 هفته پس از دریافت دوز 2، کاملاً واکسینه شده تلقی خواهید شد.

آیا اگر برای دوز 2، واکسن متفاوتی دریافت کنم، عوارض جانبی متفاوتی را تجربه خواهم کرد؟



واکسن های Moderna و Pfizer/BioNTech بسیار بی خطر بوده و عوارض جانبی مشابهی دارند. شایعترین عوارض جانبی احتمالی عبارتند از درد در ناحیه شانه/بازو در سمتی که تزریق انجام شده، بدن درد و دردهای عضلانی، لرز، احساس خستگی و حس داشتن تب. بعضی از افراد، پس از دریافت دوز دوم واکسن خود عوارض شدیدتری را تجربه می کنند (مانند احساس خستگی بیشتر یا داشتن درد عضلانی بیشتر) - این یعنی سیستم ایمنی شما در حال فعالیت است! عوارض جانبی عموماً طی یک تا سه روز بهبود می یابند.

بسیار حائز اهمیت است که 2 دوز واکسن COVID-19 را دریافت کنید تا به طور کامل علیه بیماری COVID-19 و گونه های مختلف آن واکسینه شوید. این امر از شما، عزیزانتان، و جامعه شما در برابر بیماری COVID-19 محافظت می کند.



امیدواریم که اطلاعات ارائه شده در این بولتن برای شما مفید باشد! از شما دعوت می کنیم که آن را به طور گسترده به اشتراک بگذارید، از آن به عنوان متن مورد نیاز برای ضبط یک فایل صوتی یا تصویری استفاده کنید یا آن را به زبان های بیشتری ترجمه کنید تا با دیگران به اشتراک بگذارید. لطفاً حتماً منابع را ذکر کنید: بیمارستان کالج زنان، OCASI، مرکز بهداشت اجتماعی TAIBU و Refugee 613.

صحیح در تاریخ 7 ژوئیه 2021

اعتبار اطلاعات موجود در این بولتن توسط پزشکان کاتدایی به تایید رسیده است: دکتر مبر رشید، استادیار دانشگاه تورنتو؛ دکتر ونساردیت، مدرس دانشگاه تورنتو؛ و دکتر ایزاک بوگاچ، استادیار دانشگاه تورنتو.

افراد سهمیم در تهیه محتوا: آندره چیتل، کلی گرین درود، نوا آیورز، سمیرا جیمی، تارا کیران، کیت میلر، مناکا پای، آدریان پوون، سامانتا یامین، سابینا و وهر-میلر، کریستن وات، هالی ویتمن

{ REFUGEE } 613



OCASI
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

WCHI
WOMEN'S COLLEGE HOSPITAL
Healthcare | REVOLUTIONIZED

Funded by:



Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Financé par :

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

With contributions from:

