

为什么混打不同厂牌的COVID-19疫苗是可行的

完整接种2剂COVID-19疫苗是非常重要的，这样您就可以抵御COVID-19病毒及其变种。在接种第2剂后的2周，接种者可获得完全防护。




第二针可以接种不同厂牌的COVID-19疫苗吗？

可以！混打可以安全有效地保护您免受COVID-19及其变种的侵害。


其他疫苗之前是否存在混打情形？

是的，这很常见。例如，不同品牌的乙肝疫苗或麻疹疫苗经常被混合使用。



为什么第二剂会提供不同厂牌的疫苗？

每种疫苗运送到加拿大的情况每一周都会不同，有时第一剂接种的疫苗品牌可能在第二剂时已无法获得。我们不知道您要等多久才能获得相同品牌的疫苗用于第二剂。所以接种第一个提供给您 mRNA 疫苗（Moderna 或 Pfizer）就是保护自己免受 COVID-19 感染的最好方法。



我的第二针应该接种哪种 COVID-19 疫苗？

加拿大目前提供 Moderna 和 Pfizer 的 COVID 疫苗用于大多数第一和第二剂接种。这两种疫苗本质上是相同的，而且非常有效（两剂后预防 COVID 的效果约为 95%）。



您可以安全地混合施打不同厂牌的 COVID-19 疫苗用于第一和第二剂接种。

| 第1剂 | 第2剂 |
|-----------------|--|
| Pfizer/BioNTech | Pfizer 或 Moderna 第1剂后至少21天 |
| Moderna | Moderna 或 Pfizer 第1剂后至少28天 |
| AstraZeneca | Pfizer 或 Moderna（建议） 或 AstraZeneca 第1剂后至少56天（8周） |

如果您采取了任何一种推荐组合，那么在第2次接种后的2周，您就被认为是完成了接种。



如果我在第2次接种时接种了不同的疫苗，是否会出现不同的副作用？

Moderna和Pfizer /BioNTech的COVID-19疫苗是非常安全的，而且有类似的副作用。最常见的副作用可能包括肩膀/手臂注射部位的疼痛、身体和肌肉疼痛、发冷、疲劳和发烧。有些人在注射第二针疫苗后会出现更明显的副作用（例如感觉更累或更强烈的肌肉疼痛）——这意味着您的免疫系统正在发挥作用。这些副作用通常在大约一到三天后会改善。

重要的是，您要接受两剂COVID-19疫苗，才能完全抵御COVID-19病毒及其变种。这能保护您、您的亲人和您的社区免受COVID-19病毒的侵袭。



我们希望这份公告对您有所助益！我们邀请您广为分享，用它作为录制音频或视频文件的脚本，或将它翻译成更多语言与他人分享。请务必注明出处：女子学院医院（Women's College Hospital）、OCASI、TAIBU社区卫生中心和Refugee 613组织。

资料更新至2021年7月7日

本公告中的資訊已經過加拿大醫生的驗證：醫學博士Meb Rashid, 多倫多大學助理教授；醫學博士Vanessa Redditt, 多倫多大學講師；醫學博士Isaac I. Bogoch, 多倫多大學副教授

撰稿人：Andrea Chittle, Kelly Grindrod, Noah Ivers, Samira Jeimy, Tara Kiran, Kate Miller, Menaka Pai, Adrian Poon, Samantha Yammine, Sabina Vohra-Miller, Kristen Watt, Holly Witteman



Funded by:



Immigration, Refugees and Citizenship Canada

Financé par :

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

With contributions from:

