

لماذا يمكن الخلط بين أنواع العلامات التجارية للقاح كوفيد-19؟

من المهم جداً الحصول على جرعتين من لقاحات كوفيد-19 كي تكون ملقحاً بالكامل ضد كوفيد-19 ومتغيراته. تعتبر ملقحاً بالكامل بعد مرور أسبوعين على تلقي الجرعة الثانية.

هل يمكنني الحصول على لقاح كوفيد-19 مختلف في جرعتي الثانية؟

نعم! إنه أمر آمن وفعال في حمايتك ضد كوفيد-19 ومتغيراته.




هل جرى من قبل "الخلط" بين اللقاحات الأخرى؟

نعم، هو أمر شائع جداً. على سبيل المثال، غالباً ما يُجمع بين مختلف أنواع العلامات التجارية للقاحات التهاب الكبد الوبائي من النوع ب أو الحصبة.


لماذا قدّم لي لقاحاً مختلفاً في الجرعة الثانية؟

يمكن أن تختلف عمليات توصيل كل نوع من أنواع اللقاح إلى كندا من أسبوع إلى آخر، وفي بعض الأحيان قد لا يكون نوع اللقاح الذي تلقّيته للجرعة الأولى متاحاً للجرعة الثانية عندما يمكنك الحصول عليها. نحن لا نعرف كم من الوقت سيتعيّن عليك الانتظار لتحصل على نفس نوع اللقاح لجرعتك الثانية. الحصول على أول لقاح متاح من لقاحي الحمض النووي الريبوزي المرسال (مودرنا أو فايزر) هو أفضل وسيلة لحماية نفسك من كوفيد-19.



ما هو لقاح كوفيد-19 الذي يجب أن أحصل عليه في جرعتي الثانية؟

تقدم كندا حالياً لقاحي كوفيد، مودرنا وفايزر، لمعظم الجرعتين الأولى والثانية. كلا هذين اللقاحين متطابقان بشكل أساسي وفعالان للغاية (تصل فعاليتهما إلى حوالي 95٪ في الوقاية من مرض كوفيد بعد تلقي الجرعتين).



يمكنك الجمع بأمان بين مختلف أنواع العلامات التجارية للقاح كوفيد-19 للجرعتين الأولى والثانية:

الخيارات الجرعة الثانية	اللقاح المتلقّى للجرعة الأولى
فايزر أو مودرنا على الأقل 21 يوماً بعد تلقي الجرعة الأولى	فايزر/بايونتك
مودرنا أو فايزر على الأقل 28 يوماً بعد تلقي الجرعة الأولى	مودرنا
فايزر أو مودرنا (مستحسن) أو أسترازينيكا على الأقل 56 يوماً (8 أسابيع) بعد تلقي الجرعة الأولى	أسترازينيكا



إذا تلقيت أي من المجموعات الموصى بها، تعتبر ملقحاً بالكامل بعد مرور أسبوعين على الجرعة الثانية.

هل سأعاني من آثار جانبية مختلفة إذا تلقيت لقاحاً مختلفاً لجرعتي الثانية؟



لقاحات موديرنا وفايزر/بيونتك ضد كوفيد-19 آمنة جداً وآثارها الجانبية مماثلة. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة الأكثر شيوعاً ألم الكتف/الذراع في مكان الحقن، وآلام الجسم والعضلات، وقشعريرة، وشعور بالتعب، والحمى. يُصاب بعض الأشخاص بآثار جانبية أقوى قليلاً بعد الجرعة الثانية من اللقاح (كالشعور بتعب أكثر أو وجود المزيد من آلام العضلات) - وهذا يعني أن الجهاز المناعي يعمل جيداً! تتحسن هذه الآثار الجانبية عادةً في نحو يوم واحد إلى ثلاثة أيام.

من المهم بالنسبة لك أن تتلقى جرعتين من لقاحات كوفيد-19 لتكون ملقحاً بالكامل ضد كوفيد-19 ومتغيراته. يحميك القيام بذلك أنت وأحبائك ومجتمعك من مرض كوفيد-19.



نأمل أن تستفيد من هذه النشرة! ندعوك إلى مشاركتها مع الآخرين على نطاق واسع، أو استخدامها كنص لتسجيل صوتي أو فيديو، أو ترجمتها إلى لغات أكثر لمشاركتها مع الآخرين. يرجى التأكد من إضافة المصدر: مستشفى كلية النساء، OCASI، مركز تايبو للصحة المجتمعية ومنظمة 613 Refugee.

هذه المعلومات صحيحة اعتباراً من 7 تموز/يوليو 2021

صادق على المعلومات الواردة في هذه النشرة هؤلاء الأطباء الكنديون: الطبيب الدكتور Meb Rashid، أستاذ مساعد في جامعة تورنتو؛ والطبيب الدكتور Vanessa Redditt، محاضر في جامعة تورنتو؛ والطبيب الدكتور Isaac I. Bogoch، أستاذ مشارك في جامعة تورنتو.

ساهم في كتابة هذا المحتوى: Andrea Chittle, Kelly Grindrod, Noah Ivers, Samira Jeimy, Tara Kiran, Kate Miller, Menaka Pai, Adrian Poon, Samantha Yamine, Sabina Vohra-Miller, Kristen Watt, Holly Witteman

{ REFUGEE } 613



OCASI
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

WCHI
WOMEN'S COLLEGE HOSPITAL
Healthcare | REVOLUTIONIZED

Funded by:



Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Financé par :

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

With contributions from:

pchs
Serving Diverse Communities

